



**ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России**



**Кафедра детской психиатрии и психотерапии  
Школа молодых ученых по детской психиатрии**

# ***Расстройства влечений***

**Дмитрий Владимирович Иващенко**  
***к.м.н., врач-психиатр***  
***Доцент кафедры***

***29 января 2020***

# Определение

## Расстройства полового влечения (парафилии)

- это

**наличие интенсивного и постоянного сексуального влечения к чему-либо или кому-либо, отличного от сексуального влечения к фенотипически нормальному, физически зрелому, согласному на контакт взрослому человеку.**

# Классификация МКБ-10

## Раздел F63

Расстройства привычек и влечений

**F63.0** Гемблинг

**F63.1** Пиромания

**F63.2** Клептомания

**F63.3** Трихотилломания

## Раздел F65

Расстройства полового предпочтения

**F65.0** Фетишизм

**F65.1** Фетишистский трансвестизм

**F65.2** Эксгибиционизм

**F65.3** Вуайризм

**F65.4** Педофилия

**F65.5** Садомазохизм

# Классификация DSM V

## Раздел парафилии включает:

- Эксгибиционизм;
- Вуайеризм;
- Фроттеризм;
- Мазохизм или садизм;
- Педофилия;
- Фетишизм;
- Трансвестизм;
- Другие виды парафилий.

# Критерии диагноза парафилии

**А**

Наличие сексуальных фантазий или сексуального влечения, а также поступков на этом фоне, включающих:

- а) предметы или животных;
- б) страдания или унижение себя/партнера;
- в) детей или иных несогласных на контакт лиц.


**В**

Это приводит к клинически значимому стрессу, дезадаптации в повседневной жизни

# Развитие парафилий

Начало – сексуальные фантазии, мастурбация

Поступки на почве парафилии



До 50% - примерно в возрасте 15 лет, остальные – до 19 лет

Первыми жертвами часто становятся сиблинги. Возраст пациентов при этом – даже до 9 лет

До 99% пациентов с парафилиями – мужчины. Исключение – мазохизм, здесь женщин может быть даже больше

# Этиология парафилий



Большинство были жертвами изнасилований (до 50%), жестокого обращения в детстве (до 66%)

Семьи людей с парафилиями часто были дисфункциональными, родители имели зависимость от ПАВ или психические расстройства

# Этиология парафилий

Значимых ассоциаций педофилии с носительством полиморфных вариантов генов систем тестостерона, окситоцина, эстрогена, пролактина, дофамина не установлено

Выявлено, что педофилия ассоциируется с повышенным пренатальным уровнем тестостерона, сниженным плазменным тестостероном во взрослом возрасте, а также низкой плотностью андрогенных рецепторов


# Коморбидность парафилий

Практически все пациенты с парафилиями имеют и другие психиатрические диагнозы

Наиболее часто:

- расстройства поведения (90%);
- зависимость от ПАВ (72%);
- СДВГ (71%);
- пограничное или антисоциальное расстройство личности (33-52%)

# Нарушения нормального цикла ухаживания Courtship disorders



# Вуайеризм

До 12% у мужчин, до 4% - у женщин

Предмет возбуждения –  
подсматривать за ничего не  
подозревающими людьми во время  
переодевания или сексуального  
контакта



# Эксгибиционизм

Распространенность 2-4%, в 2-3 раза чаще среди мужчин

До 60% - коморбидность с вуайеризмом

Предмет возбуждения – демонстрация своих гениталий случайным прохожим



# Фроттеризм

(от франц. *frotter* – трение)

20-30% среди людей с парафилиями

Пик приходится на возраст 15-25 лет

Предмет возбуждения – будто случайное трение о человека в общественном месте, в толпе



# Фетишизм

Нет точных данных о распространённости

Предмет возбуждения –  
предметы, обычно  
одежда лиц  
противоположного пола;  
отдельные части тела

Опасность только в том,  
что могут украсть предмет  
вожделения



# Трансвестизм

До 3% мужчин страдают данным расстройством

Возбуждение получают при переодевании в женскую одежду, нижнее белье

Считается расстройством только тогда, когда вызывает дискомфорт у самого пациента




# Садизм и мазохизм

Распространенность до 2-3% в популяции

Мазохизм опасен для самого пациента, может привести к травме или смерти.  
1/3 пациентов имеют склонность к садизму

Большинство садистов имеют коморбидное расстройство личности.  
До 75% убийств на сексуальной почве совершаются садистами.



# Педофилия

Распространенность 3-5%,  
преимущественно мужчины

Сексуальное предпочтение  
детей и подростков, минимум  
на 5 лет младше пациента.

Гомосексуальная педофилия –  
чаще рецидивы



# Жестокость к животным

Триада Макдональда (1963):  
жестокое обращение с животными,  
пиромания, энурез в детстве после 5 лет.  
Характерно для лиц с садизмом во взрослом возрасте.

Жестокое обращение с животными в детстве указывает на проблемы у ребенка.  
Выявлена достоверная связь с асоциальным и истероидным расстройством личности, а также ОКР во взрослом возрасте

# Пиромания

Считается импульсивным расстройством

Следует отличать делинквентную пироманию от обычной для детей любви к поджогам

Современный взгляд экспертов отрицает приоритет сексуального возбуждения как причины пиромании



# Клептомания

Относится к импульсивным  
расстройствам

Пациент спонтанно совершает  
кражи, вещь ценности не  
представляет

Расстройство персистирует в  
течение жизни,  
распространенность – до 0,6%,  
в три раза чаще – у женщин



# Клептомания

Характерно для детей, воспитанных в условиях эмоционального отвержения, постоянных наказаний

Коморбидна с БАР, зависимостью от ПАВ, ОКР, тревожными расстройствами

Патофизиология мало изучена, но есть данные о структурных изменениях в префронтальной коре и лимбических структурах



# Нейробиология парафилий

Нейробиология парафилий изучена мало

Основная роль отводится недостаточности функций фронтальной коры и/или правой височной доли

Гиперсексуальность проявляется при снижении подавления лимбической системы. Например, при поражении гипоталамуса, ядер шва

Получены данные об изменении кровотока в разных регионах мозга у педофилов по сравнению с контролем

# Нейробиология парафилий

## Педофилия

Есть теория, что причина – в поражении лобной коры. Это приводит к снижению волевого контроля, а также расторможенности низших потребностей и влечений

Другая теория – нарушения связей височной коры и лимбической системы, приводящих к гиперсексуальности

Третья теория – о сочетании данных нарушений. Исследования, проведенные на педофилах, это подтверждают

# Диагностика парафилий

Диагностическое интервью

Специальные опросники

Фаллометрия – оценка изменения объема полового члена при демонстрации изображений

Показ изображений с полуодетыми людьми разного возраста с замером времени просмотра каждой картинки

# Лечение парафилий

Когнитивно-поведенческая психотерапия

Специальные программы по  
психотерапевтическому сопровождению  
педофилов

Специальные образовательные программы  
(в частности, при пиромании, жестокости с  
животными)

# Лечение парафилий

Фармакологическое лечение

```
graph TD; A[Фармакологическое лечение] --> B[Антидепрессанты (СИОЗС): флуоксетин и сертралин наиболее изучены при парафилиях]; A --> C[Стероидные анти-андрогены]; A --> D[Аналоги гонадотропного релизинг-гормона];
```

Антидепрессанты (СИОЗС):  
флуоксетин и сертралин наиболее  
изучены при парафилиях

Стероидные анти-андрогены

Аналоги гонадотропного релизинг-  
гормона

# Лечение парафилий

## Антидепрессанты

СИОЗС позволяют снизить частоту фантазий, особенно в мягких случаях парафилий. Эффективны как дополнение к когнитивно-поведенческой терапии

Механизм действия – как при обсессивно-компульсивном расстройстве, снижение частоты навязчивых мыслей и компульсивных желаний

Есть мнения о независимом воздействии СИОЗС на сексуальное возбуждение при парафилии

# Лечение парафилий

На сегодня большинство экспертов сходятся во мнении, что парафилии лечению не поддаются

Основная цель лечения: предотвратить рецидивы изнасилований

Применение антиандрогенных препаратов снижают риск рецидива изнасилований почти до нуля (менее 10%)



**ФГБОУ ДПО РМАНПО**

**Кафедра детской психиатрии и психотерапии  
Школа молодых ученых по детской психиатрии**



**СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!**

©Дмитрий Владимирович Иващенко  
dvi1991@yandex.ru