

Особенности учебного плана в ординатуре

Мураховская Е.К.

ассистент кафедры
дерматовенерологии и косметологии
К.М.Н.



РМАНПО

РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

rmapo.ru

ФГБУ ГНЦДК МЗ РФ



РМАНПО



ФГАУ "Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей" МЗ РФ



РМАНПО



rmapo.ru

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ ИМ. Ф.Ф. ЭРИСМАНА» РОСПОТРЕБНАДЗОРА




РМАНПО



Цветной бульвар



РМАНПО





РМАНПО

Информация об общежитиях

В Академии имеются три общежития на 1302 койко-места:

- Ленинградское шоссе, д. 106 - 591 койко-место;
- ул. Смольная, д. 40 - 570 койко-мест.
- ул. Поликарпова, д.12/13 - 91 койко-место.



РМАНПО





rmapo.ru








РМАНПО



rmapo.ru



РМАНПО



rmapo.ru



РМАНПО

rmapo.ru



Первичная специализированная аккредитация



РМАНПО



Подготовка научных тезисов



РМАНПО

96

Ларионова Ю.Ю., Орлова Н.И.
БЕЗОПАСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНЫХ РЕТИНОИДОВ ПРИ
ЛЕЧЕНИИ АКНЕ

Руководитель: Пашкова К.И., д.м.н., доцент
Кафедры дерматовенерологии и косметологии
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва

Актуальность. Системные ретиноиды являются наиболее эффективными препаратами, применяемыми в лечении акне средне-тяжелой и тяжелой степени. Системный изотретиноин воздействует на патологическую фолликулярную кератинизацию и функцию сальных желез. Однако, препарат имеет побочные действия: ретиноидный дерматит, сухость слизистых оболочек (хейлит, конъюнктивит), тератогенный эффект на плод у женщин и изменения в лабораторных показателях. Именно они, а также риск длительного приема препарата, вынуждают у пациентов стра перед применением системных ретиноидов, что заставляет врачей-дерматологов ограничивать назначение изотретиноина.

Цель исследования. Определить методы достижения врачам-дерматологами минимизации или отсутствия побочных проявлений применения системных ретиноидов для лечения акне, сохранив эффективность терапии.

Материалы и методы. Проведен анализ научных статей по данным Российских и международных изданий (E-library, Medline/PubMed, Web of Science, Scopus, Springer) за последние 5 лет по ключевым словам: акне, изотретиноин, системные ретиноиды, ретиноидный дерматит, тератогенный эффект, беременность, хейлит, акне vulgaris, isotretinoin, systemic retinoids, retinoid dermatitis, teratogenic effect, pregnancy, cheilitis.

Результаты. Развитие ретиноидного поражения кожи и слизистых оболочек - самое распространенное нежелательное явление хейлит (до 98%

84

Короткова Э.Э.
СОЗДАНИЕ ШКОЛ АКНЕ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Руководитель: Тарасенко Г.Н., к.м.н., доцент
Кафедры дерматовенерологии и косметологии
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва

Введение. Акне является широко распространенным дерматозом. В связи с тем, что пациент не всегда владеет достаточным объемом знаний о патогенезе акне, возрастает риск неудовлетворительных результатов терапии, так как продолжительная терапия нередко ощущается агрессивной и даже неэффективной в связи с закономерным ухудшением на начальных этапах.

Цель. Проинформировать и выявить влияние «человеческого фактора» на эффективность терапии акне.

Задачи исследования. Провести опрос среди пациентов, которые имеют заболевание акне лица и более лет, при условии неоднократного посещения врача-дерматолога. Изучить изначальное раннее лечение и выявить причину отсутствия стойкой ремиссии или прогрессирования акне. Путем анкетирования собрать информацию о базовых навыках ухода за кожей с акне и базовыми знаниями нанесения топических медикаментозных средств у пациентов с акне.

Материалы и методы исследования. Было проведено анкетирование 56 пациентов с акне, структура опроса была направлена на выяснение и уточнение причины прекращения терапии, проинформирован врачом дерматологом, а также на выявление трудностей в подборе и методах ежедневного домашнего ухода за кожей с акне. Также проведен анализ литературных данных электронной библиотеки PubMed за период с 2015-2022 гг. касательно влияния акне на психосоциальную сферу пациентов и причин саморегулируемого прекращения терапии. Применены логический и аналитические методы.

69

Жубиткина Н.Б.
АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ДЕРМАТИТ НОГТЕВЫХ
ПЛАСТИН ПОД ВЛИЯНИЕМ МЕТАКРИЛАТОВ.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Руководитель: Мирашова Н.Б., к.м.н., ассистент
Кафедры дерматовенерологии и косметологии
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва

Актуальность. В последние годы наблюдается всплеск аллергического контактного дерматита от использования искусственных ногтей, что вероятно связано с большим спросом на дисперсионные гель-лаковые покрытия.

В базовых покрытиях содержатся такие компоненты как метакрилаты, которые являются обязательными компонентами для образования полимера. Неправильное использование данных препаратов, недостаточное просушивание полимера в УФ-лампах, использование несоответствующего оборудования повышает вероятность развития патологических изменений на ногтях.

Цель: продемонстрировать случай аллергического контактного дерматита на ногтях пластных ногтей на метакрилате, содержащемся в базовых гель-лаковых покрытиях и возможности терапии.

Материалы и методы. Проведен анализ клинико-анамнестических данных, механическая аппаратура обработки ногтей пластин, топических средств.

Результаты. Анализ клинико-анамнестических данных позволил установить, что пациентка К. 45 года нанесла на ногти гель-лаковое покрытие. К вечеру того же дня возникла боль в области ногтевого ложа всех пальцев кистей, жжение, ногти деформировались и приобрели арочный вид. Пациентка обратилась на прием через неделю после первых симптомов. После снятия гель-лакового покрытия был обнаружен отек слизистой всех ногтевых пластин кистей. Цвет ногтевых пластин изменился: от бледного до коричневого.

33

Брагина А.В., Николаева Р.Ю.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГРИБОВОГО МИКОЗА

Руководитель: Савкина Т.А., к.м.н., доцент
Кафедры дерматовенерологии и косметологии
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва
ФГБУ НИИЦЗ им.С.П.Воробьева, г. Москва

Введение. Т-клеточные лимфомы кожи представляют собой гетерогенную группу злокачественных лимфоиднопролиферативных заболеваний, которая характеризуется крайней агрессивной природой опухолевых Т-лимфоцитов.

Одним из современных способов диагностики ранней стадии заболевания является определение клоноальности по генам gamma цепи T-клеточного рецептора методом ПЦР.

Актуальность. Клиническая и лабораторная диагностика на ранних стадиях. Т-клеточная лимфома кожи и лимфатический синдром классическим и патоморфологическим «миссиями», которые могут соответствовать разнообразным вариантам кожных заболеваний: псориазу, парapsoriasis, экземе, атопическому дерматиту и др. Своевременно не установленный диагноз, особенно в случае лимфоиднопролиферативных заболеваний, может привести к необратимым последствиям, не позволяя начать безотлагательную терапию и начать лечение.

Клинический случай. Пациентка В., 17 лет, обратилась жалобами на высыпания на коже туловища, верхних и нижних конечностей, сопровождающиеся зудом на фоне зуда. Из анамнеза известно, что высыпания беспокоят в течение 6 месяцев, в КВД по месту регистрации выставлен диагноз: «Атопический дерматит? Псориаз? Начинено лечение: антигистаминные препараты, топические глюкокортикостероиды (применял положительный эффект). Через неделю повторно осмотра врачом.

29

Боронова Д.В.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГИГАНДСКОЙ АЛОПЕЦИИ
И ТРИХОТИКОЗАМИИ

Руководитель: Савкина Т.А., к.м.н., доцент
Кафедры дерматовенерологии и косметологии
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва

Введение. Гигантская алопеция (далее - ГА) — это аутоиммунное заболевание, характеризующееся патологическим выпадением волос, которое связано с повреждением волосяного фолликула аутоантителами. Трихотилломания (далее - ТТМ) - хроническая травматическая алопеция, развивающаяся в результате навязчивого состояния, при котором пациент не может противостоять желанию выдергивать собственные волосы. Дифференциальная диагностика ГА и ТТМ на основании клинической картины сложна, что требует дополнительных методов диагностики этих состояний.

Цель. Оценить диагностическую эффективность дерматоскопии для дифференциальной диагностики ГА и ТТМ.

Методы. Трихоскопия была выполнена с помощью ручного дерматоскопа с 10х увеличением у 14 пациентов с диагнозом ГА (гигантская форма) и у 10 пациентов с диагнозом ТТМ.

Результаты. Часть диагностических признаков наблюдается у пациентов как с ГА, так и с ТТМ - волосы в виде восклицательного знака (у 11 пациентов с ГА - 78,5%, у 3 пациентов с ТТМ - 30%), комбинированные волосы (у 9 пациентов с ГА - 64,2%, у 2 пациентов с ТТМ - 20%), желтые точки (у 12 пациентов с ГА - 85,7%, у 5 пациентов с ТТМ - 50%) и черные точки (у 11 пациентов с ГА - 78,5%, у 2 пациентов с ТТМ - 20%).

При ТТМ наблюдаются признаки не характерные для ГА - короткие волосы с трихотилломой (выдернутые концы) (у 7 пациентов с ТТМ - 70%, у

62

Дубина О.Д.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТОПИЧЕСКИХ
ИННИТОРОВ КАЛЬЦИИНЕРИНА

Руководитель: Маршан А.А., д.м.н., профессор кафедры
дерматовенерологии и косметологии
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва

Актуальность. Одним из основных методов и первой ступенью в лечении хронических дерматитов является наружная терапия. Наиболее часто с этой целью используются топические глюкокортикостероиды (далее - ГКС). Вместе с тем при длительном их применении возможны такие нежелательные явления (далее - НЯ) как атрофический дерматит, атрофия, истончение кожи, а также развитие инфекционных дерматитов. Также возможно развитие рецидива основного заболевания после отмены ГКС (синдром отмены).

Ингибиторы кальцинерина (далее - ИК) являются альтернативой с иммуносупрессивными свойствами. Их способность антагонизировать активацию Т-лимфоцитов способствует уменьшению высвобождения различных провоспалительных цитокинов.

ИК не оказывает неблагоприятного иммуномодулирующего эффекта и вызывает протормозительный эффект, сопоставимый с таковой ГКС средней силы. При этом они лишены упомянутых нежелательных эффектов.

В настоящее время данная группа препаратов сокращением нежелательных проявлений «Таргетного» «Плюс» (синдром отмены). Данные препараты используются как в моно-, так и в комбинированной терапии больных, страдающих атопическим дерматитом, красным плоским лишаем, мелким, очаговой алопецией, себорейным дерматитом, псориазом и в обострении дерматитов и др.



РМАНПО

XIV Научно-практическая конференция молодых ученых-медиков с международным участием

Безопасность медицинской помощи 19 мая 2023

Место проведения:
г. Москва, ул. Баррикадная 2/1 стр. 1



XIV Научно-практическая конференция молодых ученых-медиков с международным участием «Безопасность медицинской помощи»

СБОРНИК ТЕЗИСОВ Материалы конференции

В рамках Российского конгресса «Безопасность фармакотерапии: Noli nocere!»

19 мая 2023
г. Москва

rmapo.ru

Выступления на научных конференциях



На первом месте: ординаторы кафедры дерматовенерологии и косметологии РМАНПО раскрыли свой научный потенциал на XIV научно-практической конференции молодых ученых-медиков с международным участием «Безопасность медицинской помощи»

Победителями конференции стали:


Терапевтическая секция

Первое место:

- Жубатканова Нурия Батырбековна, врач-ординатор кафедры дерматовенерологии и косметологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва

Второе место:

Бугрова Алена Алексеевна, студентка Института клинической медицины



СОВРЕМ
УРОГ
Руководит
Кафедра
ФГБОУ ДПО

Актуальность. Уро
широко распространен
Распространенность. С
зависимости от возраст
статистической отчетно
хламидийной инфекцией
населения.

Около 75% новых с

Диагностика б



ной гранулемы бета-
пол).

был опубликован случай
льших пальцев стоп после
последующего местного
а для глаз) совместно с
редполагаемых побочных
инкардия, на фоне терапии

кованной в 2021 году,
низированной пиогенной

ды лечения.

методы: изучены литературные источники следующих
Medline/PubMed, Scopus, Springer, Web of Science,
период 2018-2023 гг. Использовались ключевые слова:
п, тербинафин, ген скваленоксидазы, устойчивые
ивогрибковая терапия.

стойчивые штаммы *T. rubrum* имеют нормальный
ола, при этом наблюдается снижение накопления
ного сквалена, что свидетельствует о недостаточной
поксидазы. SE из устойчивых штаммов на три порядка
к тербинафину, чем обычный фермент. Устойчивость к





РМАНПО

РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

rmapo.ru



РМАНПО

Академия в социальных сетях

Подписывайтесь и будьте в курсе актуальных новостей



Telegram



VK